

Cardère Sauvage

Dipsacus fullonum L.



Il appartient à la famille des Dipsacaceae, est une espèce hémicryptophyte, bisannuelle et peut atteindre 1,80 mètres.

Sa floraison se produit entre avril et septembre, les fleurs sont de couleur rose - lilas en têtes ovales de 5-8 cm de long sur 4 de large.

Ses feuilles sont opposées aux paires le long de la tige épineuse.

Mais informação em: https://www.amu.bio/_cardere_sauvage

Cultivation

Cette plante peut être multipliée par semis au début du printemps, de février à mai ou d'août à octobre, ou par division avec des pousses.

Il préfère les sols humides mais peut pousser dans les sols argileux, cependant, il a besoin de soleil pour se développer.

Quant à l'arrosage, il est nécessaire pendant les saisons de croissance de la plante, car elle résiste à la sécheresse lorsqu'elle est bien développée.

Histoire

Originnaire d'Europe du Sud, l'Asie et l'Afrique du Nord, dans certaines régions elle est une plante envahissante.

Ses inflorescences étaient utilisées pour carder la laine, d'où son nom.

Utilisation

Son "épine" a été utilisée pendant de nombreux siècles pour carder la laine.

Sa perfusion a été utilisée pour le traitement des verrues, des fistules et de l'acné et ses racines ont des propriétés diurétiques.

Le chardon est important pour l'agriculture car il attire les pollinisateurs.